

Ampligo | Compruébalo con tus propios ojos

Autorizado para el control de *Drosophila suzukii* Matsumura) o *Drosophila* de alas manchadas




Escama de San José

- Moderna e innovadora formulación ZC, seguridad y eficacia.
- Acción de contacto, el insecto muere antes de dañar la fruta.
- Residualidad comprobada.
- Rápido poder de volteo.
- Control simultáneo de **Escamas y Polillas**.

 **Ampligo**[®]

syngenta[®]



Recomendaciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis L/ha	Observaciones
Carozos (Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Cerezo, Damasco, Almendro)	Polilla Oriental de la Fruta <i>(Cydia molesta)</i>	20 cc/100 L de agua (mínimo 300 cc/ha)	Aplicar de acuerdo al monitoreo de la plaga. El mínimo por hectárea corresponde a plantas en pleno desarrollo. Utilizar un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento del follaje y especialmente de la fruta. Para volúmenes de agua mayores 1.500 L/ha respetar las dosis por concentración. No aplicar durante la floración. Aplicar hasta 2 veces por temporada a un intervalo de 21 días, de acuerdo a la presión de la plaga.
	Escama de San José <i>(Quadraspidiotus perniciosus)</i>	20 cc/100 L de agua (mínimo 400 cc/ha)	Aplicar de acuerdo al monitoreo desde el inicio de migración de ninfas de la especie. Utilizar un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento de la planta y principalmente su estructura, tronco, ramas y ramillas en donde se encuentra la plaga. Para volúmenes mayores a 2.000 L/ha respetar la dosis por concentración. No aplicar durante la floración. Aplicar hasta 2 veces por temporada, de acuerdo a la presión de la plaga.
Pomáceas (Manzano, Peral)	Polilla de la manzana <i>(Cydia pomonella)</i>	20 cc/100 L de agua (mínimo 400 cc/ha)	Aplicar de acuerdo al monitoreo de plagas. El mínimo por hectárea corresponde a plantas en pleno desarrollo. Utilizar un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento del follaje. Para volúmenes de agua mayores 2.000 L/ha respetar las dosis por concentración. No aplicar durante la floración. Aplicar hasta 2 veces por temporada a un intervalo de 21 días, de acuerdo a la presión de la plaga.
	Escama de San José <i>(Quadraspidiotus perniciosus)</i>	20 cc/100 L de agua (mínimo 500 cc/ha)	Aplicar de acuerdo al monitoreo desde el inicio de migración de ninfas de la especie. Utilizar un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento de la planta y principalmente su estructura, tronco, ramas y ramillas en donde se encuentra la plaga. Para volúmenes mayores a 2.500 L/ha respetar la dosis por concentración. No aplicar durante la floración. Aplicar hasta 2 veces por temporada, de acuerdo a la presión de la plaga.
Nogal	Polilla de la manzana <i>(Cydia pomonella)</i> Polilla del nogal <i>(Ectomyelois ceratoniae)</i>	20 cc/100 L de agua (mínimo 600 cc/ha)	Aplicar de acuerdo al monitoreo de plagas. El mínimo por hectárea corresponde a plantas en pleno desarrollo. Aplicar un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento de la fruta. Para volúmenes de agua mayores 3.000 L/ha respetar las dosis por concentración. Aplicar hasta 2 veces por temporada a un intervalo de 21 días, de acuerdo a la presión de la plaga.
	Escama de San José <i>(Quadraspidiotus perniciosus)</i>	20 cc/100 L de agua (Mínimo 600 cc/ha)	Aplicar de acuerdo al monitoreo desde el inicio de migración de ninfas de la especie. Utilizar un volumen de agua que permita un adecuado cubrimiento de la planta y principalmente su estructura, tronco, ramas y ramillas en donde se encuentra la plaga. Para volúmenes mayores a 3.000 L/ha respetar la dosis por concentración. Aplicar hasta 2 veces por temporada con un intervalo de 21 días, de acuerdo a la presión de la plaga.

Cutivos

Damasco, Durazno, Nectarino, Ciruelo, Cerezo, Manzano, Peral, Membrillo.

Vides, Arándano, Frambuesa, Frutilla y Mora.

Plagas

* *Drosophila suzukii* (*Matsumura*) o *Drosophila de alas manchadas*

Dosis

125 - 150 ml/ha

Observaciones

Aplicar de acuerdo al monitoreo de la plaga, desde inicio de la aparición de los primeros individuos, dirigiendo la aspersión a la zona de los insectos. Aplicar con buen cubrimiento.

* Resolución SAG N° 5951

DESCÚBRENOS



Descarga Neoreader desde tu móvil en <http://get.neoreader.com/>

www.syngenta.cl

2020 Ampligo

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

Afipa Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio AFIPA.

• RM.: 99679-1759 / 97888- 8476 / 96689-9004 / 97516-7864 / 97398-2577 • III y IV Región: / 98299-8012 / 9 3389-2584 • V: 99887-2013 / 99887-1808 • VI Región: 99887-2047 / 99887-1820 / 95189-7482 / 96207-4572 / 95149-5937 • VII Región: 98409-6734 / 97386-0424 / 96846-3449 / 94444-1792 • VIII Región: / 99919-1263 / 94428-6274 • IX Región: 94400-6426 / 99837-6397 / 99078-7182 / 94444-1793 / 94094-5223 • X - XIV Región: 95209-7693 / 95678-9193 / 93198-8992 / Semillas de Vegetales: 9 5739 1471 / 9 4071 7910

® Marca registrada de Syngenta.

Las características antes descritas están sujetas al manejo y/o condiciones edafoclimáticas. Para mayor información y asesoría contacte a su asesor agroAMIGO

Ampligo®

syngenta

MIPNET