### PRIME+® 125 EC

# FITOREGULADOR Concentrado Emulsionable (EC)

#### Composición

Flumetralina\* Coformulantes, c.s.p.

12,5% p/v (125 g/L) 100% p/v (1 L)

\* N-(2-cloro-6-fluorobencil)-N-etil-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidina

#### INFLAMABLE- NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

PRIME+ 125 EC es un fitoregulador sistémico que se usa para inhibir los brotes en tabaco. Una aplicación de PRIME+ 125 EC proveerá el control de brotes en tabaco para toda la temporada.

#### Contenido Neto del Envase:

## "LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero № 4134 Fabricado por:

Syngenta Crop Protection AG., Werk Rosental Schwarzwaldallee 215, CH-4058, Basilea, Suiza Syngenta Protecao de Cultivos Ltda, Rodovia SP 332 KM 130, CEP 13140-000, Paulinia, SP - Brazil Importado y Distribuido por: Syngenta S.A.

Av. Vitacura 2939, Of. 201 – Las Condes

Santiago – Chile.

Lote de fabricación:

Fecha de vencimiento:

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.





Grupo químico: el ingrediente activo Flumetralina pertenece al grupo químico de las 2,6-dinitroanilinas.

#### **Precauciones y Advertencias:**

- durante su manejo: vestir ropa de protección personal (durante la preparación usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y delantal impermeable y durante la aplicación usar guantes impermeables, antiparras, máscara con filtros para vapores orgánicos, botas de goma y overol impermeable). Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el producto concentrado ni la neblina de pulverización. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse inmediatamente cualquier salpicadura. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un médico. No contaminar aguas, alimentos o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada. Evitar la deriva a lugares no deseados.
- después de su manejo: lavarse las manos y cara con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo; lavar aparte la ropa y el equipo usados. Instrucciones de Triple Lavado: Una vez vacío el envase agregar agua hasta ¼ de su capacidad, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido en la máquina pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, destruir los envases vacíos (cortándolos y perforándolos) y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Eliminar los desechos de pulverización en tierras sin cultivar. Almacenar bajo llave, en los envases originales cerrados y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje. Evitar almacenar por debajo de 0°C y por encima de 35°C.

**Información para el medio ambiente:** muy tóxico para organismos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves ni abejas.

Síntomas de intoxicación: no específicos.

Primeros auxilios: en caso de sospechar una intoxicación durante el manejo del producto, detener el trabajo y buscar asistencia médica de inmediato. Retirar al afectado de la zona de peligro y aplicar las medidas de primeros auxilios. En caso de: Inhalación: llevar al paciente a un área ventilada. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, administre respiración artificial y acuda inmediatamente al médico llevando la etiqueta; Contacto con la piel o ropa: retirar la ropa contaminada y lavar bien las partes del cuerpo afectadas con abundante agua. Si las molestias persisten, consultar a un médico; Contacto con los ojos: lavarlos con los párpados abiertos con abundante agua limpia durante 15 minutos, cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua limpia por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 minutos. En ambos casos consultar a un médico o CITUC; Ingestión: buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto. No inducir el vómito. Nunca dar nada por vía oral a un paciente inconsciente y mantenerlo acostado de lado. Mantener al paciente abrigado y en reposo.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**Tratamiento Médico de Emergencia**: ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico protegiendo la vía aérea. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora de ingestión.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"

"ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEER LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD"

"EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"

"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS

INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"

"MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO"

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS

QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"

"TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO Y ASEGURAR LA CARGA, DE MODO DE EVITAR CAIDAS O DERRAMES"

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"

"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO"

"LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana: En caso de <u>INTOXICACION</u> llamar al **☎**: 02 2635 3800 En caso de <u>EMERGENCIAS QUÍMICAS</u>, <u>DERRAME</u> o <u>INCENDIO</u>, llamar al **☎**: 022247 3600

Consultas a Syngenta S.A.: 02 2941 0100 - Horario de oficina - Santiago - Chile

Se recomienda el uso de **PRIME+** 125 EC de acuerdo al siguiente programa de tratamientos:

#### Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivos	Dosis	Observaciones
	(L/ha)	
Tabaco	15 cc/ planta de una solución al 1,5-2,0% en agua (1,5 - 2 L por cada 100 L de agua).	Aplicar la solución preparada con un dosificador, sólo una vez por temporada, cuando la mayoría de las plantas de tabaco se encuentren desde el estado de botón floral hasta botón elongado. Aplicar sobre la parte superior de cada planta, permitiendo el escurrimiento del líquido a lo largo de todo el tallo, de manera que el producto llegue a todas las yemas axilares de la planta. El decapitado final puede realizarse antes o después de la aplicación de PRIME+ 125 EC. Si se decapita antes, aplicar PRIME+ 125 EC dentro de las 24 horas posteriores al mismo. Todos los brotes de más de 2,5 cm deben ser arrancados manualmente al momento de la aplicación, pues no serán controlados por PRIME+ 125 EC. Usar la dosis mayor en plantas con gran número de hojas y/o de mayor vigor.

**Método de preparar la solución**: agregar la cantidad requerida de **PRIME+ 125 EC** en el estanque del equipo pulverizador a medio llenar con agua y agitar durante la preparación de la mezcla, completando luego el volumen total de agua a utilizar, también con agitación.

Compatibilidad: no se recomienda aplicar PRIME+ 125 EC con otros productos.

Incompatibilidad: no mezclar PRIME+ 125 EC con fungicidas.

**Fitotoxicidad**: Aplicaciones efectuadas antes del comienzo de botón floral pueden provocar un decapitado químico y hojas superiores distorsionadas. Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, **PRIME+ 125 EC** es bien tolerado por el cultivo en que se recomienda y no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

**Período de carencia**: no corresponde debido a la naturaleza de la aplicación.

**Tiempo de reingreso:** no ingresar al área tratada antes de 12 horas después de la aplicación, a menos que se vista ropa de protección. No corresponde indicar período de reingreso para animales por la naturaleza del cultivo.

**Observación**: el fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y fecha de vencimiento anula toda garantía. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos por los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante.

La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral.

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento tiene solo un carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información contenida en la etiqueta adherida a los envases de los productos Syngenta. Por consiguiente, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo del producto es aquella contenida en la etiqueta adherida al envase de cada producto.