Precauciones y Advertencias:
Grupo químico: el ingrediente activo Brodifacum pertenece al grupo químico de las 4-hidroxicumarinas.
- durante su manejo: usar guantes impermeables. Evitar el contacto con la boca. No comer, beber ni fumar durante su utilización. No contaminar aguas, alimentos o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada. No colocar **KLERAT® MINIBLOQUES** en lugares donde los niños, animales y aves puedan acceder fácilmente.
- después de su manejo: lavarse las manos y cara antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados. Inutilizar y eliminar los envases vacíos de acuerdo a las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso. Los animales que mueran por efecto de **KLERAT® MINIBLOQUES** deberán ser recogidos del lugar por el personal de la empresa aplicadora para ser cremados o enterrados de inmediato y cubiertos con una capa de cal, a una profundidad tal que no puedan ser descubiertos por otros animales. Se debe recoger todo resto del producto no consumido, una vez que se hayan efectuado las labores de aplicación.

Almacenar bajo llave, en su envase original cerrado y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje.

Síntomas de intoxicación: típicos de los anticoagulantes. Puede presentarse sangrado nasal, hemorragia gingival, equimosis (moretones) y hematomas alrededor de las articulaciones.

Primeros auxilios: en caso de sospechar una intoxicación, buscar asistencia médica de inmediato. **En caso de contacto con la piel**, retirar ropa y zapatos. Lavar con agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos**, lavar los ojos inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Si el afectado utiliza lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Acudir al médico si persisten las molestias oculares. **En caso de inhalación**, llevar al afectado a un lugar bien ventilado y mantenerlo en reposo y abrigado. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar asistencia médica. **En caso de ingestión**, no provocar el vómito; llevar a la persona junto con la etiqueta del producto al médico para tratamiento inmediato. Mantener al afectado en reposo y abrigado. No administrar nada por vía oral a una persona afectada que se encuentre inconsciente y mantenerla acostada de lado. Bajo ninguna circunstancia se debe dar leche, bebidas alcohólicas, sedantes o analgésicos.

Antídoto: Vitamina K1(Fitomenadiona)

Tratamiento médico de emergencia: monitorear el tiempo de Protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En caso de aumento o signos de sangrado, administrar Vitamina K1 (Fitomenadiona); en adultos y niños mayores de 12 años: 15-25 mg/día VO y 5-10 mg IM; en niños 5-10 mg/día VO y 1 - 5 mg IM. Si hubo una ingestión abundante en un adulto, administrar Vitamina K1 de inmediato y evaluar el uso de lavado gástrico y Carbón Activado. Recordar que el máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera durante la primera hora de ingestión. En casos de intoxicación severa y con un paciente sangrando, considerar el uso de Vitamina K1 EV, junto con una transfusión de sangre completa o plasma y monitorear los tiempos de Protrombina y Hematocrito cada 6 - 12 horas.

Información para el medio ambiente: tóxico para animales, peces, organismos acuáticos y aves. Sin embargo la formulación Minibloques es muy poco soluble en agua. Bajo riesgo para abejas, ya que no estarán directa o indirectamente expuestas al producto.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"
"EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"
"INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"
"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA"
"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:
En caso de INTOXICACION llamar al ☎: 2 2635 3800
En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al ☎: 2 2247 3600
Consultas a Syngenta S.A.: 2 2941 0100 - Horario de oficina - Santiago - Chile

20/08/18

KLERAT® MINIBLOQUES

RODENTICIDA
Cebo (RB)

Composición:

Brodifacum*	0,005 % p/p (0,25 mg/minibloque, aprox.)
Coformulantes, c.s.p.	100 % p/p (1 kg)

* 3-[(1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicumarina.
**Contiene Benzoato de denatonio (amargante Bitrex)) 0,001 % p/p

NO INFLAMABLE- NO CORROSIVO- NO EXPLOSIVO

KLERAT® MINIBLOQUES Encerados es un rodenticida anticoagulante de segunda generación, eficaz para el control de todas las especies de roedores y lagomorfos. Los minibloques son para uso forestal y agrícola y pueden ser utilizados en chacras, cultivos, viveros, plantaciones frutales y forestales. **KLERAT® MINIBLOQUES** contiene **Bitrex**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso. La muerte de los roedores y lagomorfos ocurre 4 a 5 días después que han ingerido una pequeña cantidad de **KLERAT® MINIBLOQUES,** no generando desconfianza para su consumo.

Contenido Neto del Envase: 10 kilos (2.000 minibloques aproximadamente)

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

La aplicación de plaguicidas destinados al control de lagomorfos y roedores, sólo podrá ser realizado por empresas inscritas en el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG en el Registro Nacional de Empresas Controladoras de Lagomorfos y Roedores

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1176
Fabricado por:
Syngenta Protecao de Cultivos Ltda, Rodovia SP 332 KM 130, CEP 13140-000, Paulinia, SP – Brasil
Server Química Ltda., Rua Italia N°98, Marilia, Sao Paulo, Brasil
Server Química Ltda., Av. Norberto de Carvalho, n° 1473 - Bloco 7B - Lorenzeti - Vera Cruz - SP - CEP: 17560-000; Brasil
Babolna Bioenvironmental Centre Ltd. Dr. Köves János u. 3., H-2943, Babolna, Hungría
Importado y Distribuido por:
Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Teléfono: 2 2941 0100, Santiago, Chile

Lote de fabricación:
Fecha de vencimiento: (mes y año)
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

syngenta

INSTRUCCIONES DE USO:

KLERAT® MINIBLOQUES viene listo para el uso como cebo en grandes superficies exteriores, permitiendo una amplia cobertura, lo que hace más económico el control de roedores y lagomorfos.
La primera fase de control consiste en determinar las áreas con señales de presencia de roedores, madrigueras, caminos, fecas frescas, huellas y frutas y plantas con daño reciente.
Aplicar **KLERAT® MINIBLOQUES** en aquellos lugares agrícolas y forestales donde los roedores y lagomorfos circulan, viven y se alimentan, de acuerdo a los siguientes programas de tratamientos:

Instrucciones de Uso:

Lugares	Plagas	Dosis (kg/ha)	Observaciones
Sectores agrícolas (Chacras, Cultivos, Viveros y Plantaciones frutales) Plantaciones forestales	Roedores	1,0 - 2,0	Comenzar la cebadura tan pronto aparezcan las primeras señales de infestación. Repetir cada 7 días, si fuese necesario, hasta que haya cesado el consumo. Ubicar 2 a 3 minibloques por madriguera activa y distribuir 2 a 4 minibloques en forma lineal cada 10 a 20 metros en las áreas afectadas. La dosis dependerá de la presión de roedores. Aplicar un máximo de 10 veces en la temporada
	Lagomorfos (Conejos y Liebres)	1,5 - 2,5	Ubicar 4 a 5 minibloques por madriguera activa y distribuir 6 a 8 minibloques en todos aquellos lugares donde se detecte actividad reciente de lagomorfos (defecaderos activos, revolcaderos, caminos, quebradas, matorral nativo, etc.). Aplicar un máximo de 10 veces en la temporada

Importante: la aplicación de cebos rodenticidas para el control de roedores y lagomorfos en ecosistemas rurales y forestales debe ser dirigida por un especialista e informada al SAG previamente.
Durante la cebadura deben colocarse carteles visibles, indicando que el sector ha sido tratado con un rodenticida (colocar una calavera).

Prevenir el acceso de aves y otros animales que no son objeto de control.

Incompatibilidad: no corresponde, pues **KLERAT® MINIBLOQUES** debe aplicarse solo.

Fitotoxicidad: no corresponde por la naturaleza de la aplicación.

Período de carencia: no se indica por la naturaleza de la aplicación.

Tiempo de reingreso: no corresponde por la naturaleza de la aplicación.

Importante: la información contenida en esta etiqueta representa el más reciente conocimiento de Syngenta en las materias informadas. No obstante, Syngenta garantiza exclusivamente la calidad del Producto y de su contenido activo, mientras esté bajo su control directo. Las instrucciones de conservación y uso describen, conforme a las pruebas realizadas, la forma apropiada de operar el Producto para obtener los resultados esperados. Sin embargo, dichas instrucciones no constituyen garantía explícita ni implícita, debido a la existencia de circunstancias externas en un medio biológico cambiante, que se encuentran fuera del control de Syngenta. Todos nuestros productos han sido debidamente probados; a pesar de ello, no es posible testear todos los usos, formas o métodos de aplicación, medios agroclimáticos, suelos, fechas de aplicación y sistemas de cultivo a los que el Usuario pueda eventualmente someter al Producto, por los que Syngenta no se hace responsable. Ante cualquier duda, consulte con su asesor técnico de Syngenta. Asimismo, una vez que el Producto sale del control directo de Syngenta, cumpliendo las características anteriormente señaladas, el Usuario asume todos los riesgos asociados al uso, momento y manejo del Producto, aun siguiendo las instrucciones contenidas en esta etiqueta, como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en las jurisdicciones relevantes. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del Producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral.

CUIDADO