

De siembra a cosecha, siga la huella Syngenta

- + Fungicida sistémico para el control de Phoma en Raps
- + Acción preventiva y curativa



 **Taspa**[®]

syngenta.



Factores que influyen en el desarrollo de Phoma en el cultivo de raps

- Variedad
- Clima (alta humedad relativa)
- Sistemas o métodos de cultivo
- Rotaciones
- Elección del producto / estrategia de control



Síntomas de Phoma

Raps con distintos niveles de infección

1



2



3



Ya cerca de la cosecha podemos observar las cañas con el daño por Phoma (cañas de color café)



Cañas raps con Phoma

Para el **control de Phoma lingam**, la elección del producto y el momento de aplicación son factores claves para lograr un buen resultado

Umbral de aplicación: baja incidencia inicial, menor a un 10% de las plantas.

Prioridad debe ser dada a cultivos en menor estado de desarrollo o variedades de mayor susceptibilidad.

El uso de Taspa y adecuados momentos de control aseguran mantener el potencial de rendimiento.





Taspa[®]

acción curativa

Monitoreos de Phoma han mostrado que la infección se puede desarrollar en 10 días desde el umbral a 100% de infección.

El efecto curativo de los productos es esencial para evitar la diseminación de la enfermedad.

Los ensayos han mostrado que **TASPA** posee un control curativo de la enfermedad y reduce la incidencia de pie negro.

TASPA tiene un largo efecto residual, característica muy relevante, considerando el largo período de presencia del inóculo durante el cultivo.

Phoma
controlada por TASPA



PACK PHOMA

La solución para enfrentar la enfermedad de Phoma en el cultivo de raps, prevención y control mediante dos aplicaciones foliares de fungicida.

Cada Pack incorpora

20 lt  Stereo[®]

5 lt  Taspa[®]

10 ha

1^{ra} aplicación

 Taspa[®]
0.5 L/ha

Aplicar cuando existan condiciones predisponentes para la enfermedad o con la aparición de los primeros síntomas.



2^{da} aplicación

 Stereo[®]
2 L/ha



1 ha

Resultados con **Taspa**® en el control de Phoma


Resumen 4 localidades (Pailahueque, Quino, Curacautín, Galvarino) 2008-2010



Resultados con 1 y 2 aplicaciones de Taspa en el control de Phoma Localidad de Traiguén 2008



Observe como **TASPA** es consistente en el control de la enfermedad, la cual influye directamente sobre los rendimientos obtenidos.



2014

DESCÚBRENOS



Descarga Neoreader desde tu móvil en www.get.neoreader.com/

www.syngenta.cl

 **Afipa** Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto. Entregue los envases vacíos con Triple Lavado en los Centros de Acopio Afipa.

• RM.: 7979-7746 / 8299-1020 / 9999-6480 / 9679-1762 / 7897-8469 / 9887-1808 • III y IV Región: 8419-5059 / 8299-8012
V Región: 9887-2013 / 7888-8475 / 5739-1471 • VI Región: 9887-2047 / 9887-1820 / 9078-7190 / 9999-6483 / 7888-8476 / 5189-7482 • VII Región: 9078-7188 / 8409-6734 / 7398-2577 • VIII Región: 9218-5662 / 8418-7160 • IX Región: 7549-2826 / 9919-1305 / 9499-6008 / 9078-7182 • X-XIV Región: 7889-6183



® Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.